

I M P F K A L E N D E R

FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE IM FREISTAAT SACHSEN - Stand 01.01.2011

Lebensalter	Impfung gegen
ab 7. Lebenswoche	Impfung gegen Rotaviren 2- bzw. 3-malige Schluckimpfung (je nach Impfstoff)
ab 3. Lebensmonat	Beginn der Grundimmunisierung gegen: Diphtherie (D) , Keuchhusten (Pa) , Tetanus (T) , Haemophilus-influenzae-Typ b (Hib) , Kinderlähmung (IPV) , Hepatitis B (HBV) (evtl. Hepatitis A und B ab 13. Monat) Kombinationsimpfstoffe bevorzugen, 3 Injektionen; Meningokokken C (3. Lebensmonat bis 18. Lebensjahr) konjugierter Impfstoff, Pneumokokken (3. Lebensmonat bis 2. Lebensjahr) konjugierter Impfstoff
ab 7. Lebensmonat	Virusgrippe (Influenza) jährlich (Fachinformationen beachten)
ab 13. Lebensmonat	Grundimmunisierung gegen: D, Pa, T, Hib, IPV, HBV , Pneumokokken und Meningokokken C vervollständigen Masern-Mumps-Röteln (MMR) 1. Impfung Hepatitis A und B Grundimmunisierung 3 Injektionen, falls nicht im Säuglingsalter mit HBV begonnen, wenn ja, Hepatitis A monovalent impfen (2 Injektionen) Varizellen (Windpocken) (VZV) , 1. Impfung für alle Kinder mit negativer Windpockenanamnese
ab 6. Lebensjahr	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa oder DTPa) Auffrischimpfung Masern-Mumps-Röteln (MMR) 2. Impfung Varizellen (Windpocken) (VZV) 2. Impfung
ab 11. Lebensjahr	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa) Kinderlähmung (IPV) Auffrischimpfung, Vierfach-Impfung
13.-26. Lebensjahr	Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV) für alle Mädchen / weiblichen Jugendlichen und Frauen 3 Injektionen
ab 50. Lebensjahr	Gürtelrose (Herpes zoster) 1 Impfung
ab 60. Lebensjahr	Pneumokokken 1 Injektion (alle 6 Jahre)
alle 10 Jahre	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa) Kinderlähmung (IPV) Auffrischimpfung, Vierfach-Impfung

Versäumte Impfungen bitte frühestmöglich nachholen!